

## 臺中市111年度校園流感疫苗接種後注意事項

親愛的家長您好，您的子女已於\_\_年\_\_月\_\_日於本校完成流感疫苗接種。提醒您，請多注意孩子接種後身體狀況，如有不適情形，請儘速帶孩子至醫療院所就診。

### 【接種後注意事項】

- 一、流感疫苗是一種相當安全的不活化疫苗，接種後可能會有注射部位疼痛、紅腫，少數的人會有全身性的輕微反應，如發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，但一般均於接種後一到二天內恢復，嚴重的副作用則極少發生。
- 二、接種流感疫苗後48小時內約有1-2%可能有發燒反應，應**主動**告知醫師曾經接種過流感疫苗以作為鑑別診斷的參考。接種48小時後仍然持續發燒時，應考慮可能另有其他感染或發燒原因。
- 三、接種後如有持續發燒、意識或行為改變、呼吸困難、心跳加速等不適症狀，應儘速就醫，並通報學校班導師/護理人員，或撥打下列諮詢專線，將有專人為您服務。
- 四、暈針通常是因為對打針的心理壓力與恐懼感，轉化成身體的症狀出現眩暈與噁心等症狀，大多發生於青少年集體接種疫苗時。大規模疫苗接種時，偶會發生聚集性暈針現象，被稱為集體心因性疾病。暈針反應與疫苗本身安全性無關，也不會造成身體健康的後遺症。倘若學生於回家後暈針現象持續，宜送醫診治。
- 五、完成疫苗接種後，雖可降低感染流感的機率，但仍有可能罹患其他非流感病毒所引起的呼吸道感染，請注重個人衛生保健及各種預防措施，以維護身體健康。
- 六、使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。
- 七、貴子女如為出生後首次接種流感疫苗之國小二年級以下學童，如有自覺需要，可於第一劑接種至少四週後，至醫療院所自費接種第二劑。

如有接種後相關問題，請洽詢轄區衛生所：

中西區衛生所	22223811	大甲區衛生所	26872153
東區衛生所	22834121	清水區衛生所	26222639
南區衛生所	22629735	沙鹿區衛生所	26625040
北區衛生所	22359182	梧棲區衛生所	26562809
西屯區衛生所	27027068	后里區衛生所	25562048
南屯區衛生所	23827640	外埔區衛生所	26833208
北屯區四民衛生所	24211945	大安區衛生所	26713681
北屯區軍功衛生所	22392638	烏日區衛生所	23381027
豐原區衛生所	25261170	大肚區衛生所	26992111
東勢區衛生所	25873872	龍井區衛生所	26352228
神岡區衛生所	25622792	太平區衛生所	23938083
潭子區衛生所	25324643	霧峰區衛生所	23393022
大雅區衛生所	25661091	大里區衛生所	24061500
新社區衛生所	25811704	和平區衛生所	25942781
石岡區衛生所	25721887	和平區梨山衛生所	25989540



臺中市政府衛生局諮詢  
25270780  
疾病管制署疫情通報  
線：1922



專線：04-  
及諮詢專

